

VODNIK ZA BOLNIKE

EURneffy
(adrenalin)

Izobraževalno gradivo je pripravljeno z namenom zagotavljanja varne in učinkovite uporabe zdravila ter ustreznega obvladovanja določenih pomembnih tveganj in je odobreno s strani JAZMP (avgust 2026).

Namen vodnika je, da vam svetuje, kaj morate storiti v primeru hude alergijske reakcije ali anafilaksije. Tako bolniki kot skrbniki se morajo seznaniti s tem vodnikom, da bodo znali prepoznati simptome alergijske reakcije in vedeli, kako varno in učinkovito uporabiti zdravilo.

Navodila za uporabo zdravila:

Zdravilo uporabite takoj, ko opazite simptome hude alergijske reakcije (simptomi so navedeni na drugi strani). NE odlašajte z uporabo, saj se lahko resnost simptomov hitro spremeni.


Če se simptomi poslabšajo ali se znova pojavijo po približno 10 minutah ali če pride do napake pri odmerjanju, dajte drugi odmerek zdravila z novim pršilom za nos v ISTO nosnico kot prvi odmerek in poiščite nujno medicinsko pomoč.



1. Držite

Pršilnik za nos držite, kot je prikazano. Pršilnik za nos držite s palcem na dnu bata in po enim prstom na vsaki strani šobe.

Bata NE vlecite in ne pritiskajte.
NE preizkušajte ali pršite vnaprej; vsak pršilnik za nos ima samo en odmerek.



2. Namestite

Konico pršilnika za nos vstavite v nosnico, dokler se prsti ne dotaknejo vašega nosu. Držite naravnost, usmerjeno proti čelu.



3. Pritisnite

Odločno pritisnite bat, dokler se ne zaskoči in razprši zdravila v nosnico.

Pršilnika za nos NE usmerite v notranje ali zunanje stene nosu.
Ni potrebe po vdihu.

Pri uporabi zdravila

Po potrebi lahko bolniki ležijo z dvignjenimi nogami, če pa v takem položaju težko dihajo, lahko sedijo. Nezavestne bolnike je treba položiti na bok v ležeči položaj, da preprečite zadušitev. Če simptomi ne izginejo, morate, če je mogoče, ostati z drugo osebo do prihoda medicinske pomoči.



Opis zdravila

Zdravilo je pršilo za nos z adrenalinom za odrasle in otroke s telesno maso 30 kg ali več za nujno zdravljenje alergijskih reakcij, vključno z anafilaksijo (nenadnimi, hudimi in včasih življenjsko nevarnimi alergijskimi reakcijami), zaradi pikov ali ugrizov insektov, hrano, zdravil in drugih alergenov (snovi, ki povzročajo alergijo) ter idiopatsko anafilaksijo (vzrok anafilaksije ni znan) ali anafilaksijo, ki jo povzroča telesna aktivnost.

Izobraževalno gradivo je na voljo na povezava www.jazmp.si/dokumenti in www.EURneffy.si ali pod QR kodo, ki jo lahko preberete s pametnim telefonom ali drugo mobilno napravo.



Zdravilo uporabite takoj, ko opazite simptome hude alergijske reakcije.

Po uporabi zdravila

Takoj poiščite nujno medicinsko pomoč za natančno spremljanje anafilaktične reakcije in za primer, če je potrebno nadaljnje zdravljenje. Če ne morete poklicati, prosite nekoga drugega, da pokliče namesto vas.

Kako prepoznati hudo alergijsko reakcijo

Simptomi alergijske reakcije lahko vključujejo:

- srbenje kože
- dvignjen izpuščaj (kot je koprivnica)
- rdečico
- otekanje ustnic, grla, jezika, dlani in stopal
- sopenje
- hripavost
- zasoplost
- siljenje na bruhanje
- bruhanje
- trebušne krče
- izgubo zavesti
- občutek zaskrbljenosti
- hiter srčni utrip
- napade krčev
- drisko (redko blato)
- izgubo nadzora nad sečnim mehurjem

POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH

Pred uporabo zdravila natančno preberite Navodilo za uporabo. Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujete z zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem. O domnevnem neželenem učinku lahko poročate tudi neposredno Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP (www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/).

Prepričajte se, da vi, vaš otrok, vaša družina, skrbniki, sodelavci in učitelji veste, kako in kdaj uporabljati zdravilo.

Shranjevanje in ravnanje

Vsak vsebnik za enkratno uporabo vsebuje en odmerek adrenalina in je na voljo v pretisnem omotu z navodili za uporabo.

V primeru, da imate predpisana 2 vsebnika imejte vedno oba s seboj.



Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila. Če pršilo za nos nenamerno zamrzne, ne bo delovalo. Pustite, da se pršilo za nos oddaljuje vsaj eno uro; ne uporabite, če je vsebina še vedno zamrznjena ali ni popolnoma oddaljena. Zamrzovanje ne vpliva na rok uporabnosti zdravila.



Redno preverjajte datum izteka roka uporabe in zamenjajte zdravilo pred iztekom roka uporabe.